

# DEDALUS® WG

Fungicida sistemico per la difesa di melo, pero, pesco, nettarine, ciliegio, albicocco, susino, vite, cereali, colture orticole e tappeti erbosi



## CARATTERISTICHE

DEDALUS WG è un fungicida sistemico a base di tebuconazolo, sostanza attiva appartenente alla famiglia dei triazoli. Il prodotto è particolarmente indicato nella difesa delle Drupacee dagli attacchi di Monilia nelle fasi fiorali ed in pre-raccolta, nella difesa dei cereali dai principali patogeni (incluse le pericolose Fusariosi) e nella vite dagli attacchi di Oidio. Su Pomacee è efficace su Ticchiolatura, Maculatura bruna ed Oidio. Possiede attività preventiva e curativa. La formulazione in granuli idrodispersibili è di facile manipolazione e non crea polveri inalabili durante la preparazione della miscela.


## AVVERTENZE

Impiegare volumi d'acqua adeguati allo sviluppo della pianta e le quantità massime ad ettaro riportate in etichetta. DEDALUS WG può essere miscelato con fungicidi od insetticidi a reazione neutra.

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
MELO	Ticchiolatura e Oidio	50-60 g/hL	In miscela con fungicidi di copertura. Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
PERO	Ticchiolatura	50-60 g/hL	In miscela con fungicidi di copertura. Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
	Maculatura bruna	60-90 g/hL	
PESCO, NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO EUROPEO	Monilia e Botrite	60-90 g/hL	Eseguire 1-2 applicazioni a cavallo della fioritura e 1-2 applicazioni in pre-raccolta ad un intervallo di 7 giorni
	Oidio	60-90 g/hL	-
	Ruggine del susino	60 g/hL	Applicare 1 o 2 volte preventivamente od alla comparsa dei primi sintomi
VITE	Oidio	50 g/hL	Applicare ogni 10-14 giorni in miscela estemporanea con NIMROD od in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione
MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, COCOMERO, POMODORO, PEPPERONE, CARCIOFO	Oidio	60 g/hL	Intervenire con applicazioni preventive ogni 10-12 giorni al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia
ASPARAGO	Oidio, Ruggini, Stemfiliosi	60 g/hL	Intervenire durante la stagione vegetativa, esclusivamente dopo la raccolta dei turioni, al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia
FRUMENTO, ORZO	Oidio, Septoria, Ruggini, Fusariosi, malattie del piede	1,25 kg/ha	Impiegare in fase di accestimento-levata contro le malattie del piede, ad inizio levata-spigatura contro Oidio, Septoria e Ruggini ed in piena fioritura contro le Fusariosi della spiga
TAPPETI ERBOSI	Fusariosi, Sclerotinia, Rizoctonia	1,9-2,5 kg/ha	Intervenire alla prima comparsa dei sintomi

## CONFEZIONE

Astuccio da 1 Kg (10x1)



## INTERVALLO DI SICUREZZA

30 giorni per melo, frumento ed orzo  
15 giorni per pero  
14 giorni per vite  
7 giorni per pesco, nettarino, ciliegio, albicocco, susino, melone, cocomero e carciofo  
3 giorni per cetriolo, zucchini, pomodoro e peperone

## COMPOSIZIONE

Tebuconazolo puro 20%

## FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

## CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xn - Nocivo

## CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso per l'ambiente

## N° DI REGISTRAZIONE

14459 del 05-06-2009