



CARNIVAL®

Fungicida sistemico per la difesa dei cereali, barbabietola da zucchero e tappeti erbosi



CARATTERISTICHE

CARNIVAL è un fungicida di contatto e traslaminare ad ampio spettro d'azione, ad azione preventiva e curativa. È particolarmente indicato nel controllo delle malattie dei cereali, della barbabietola da zucchero e dei tappeti erbosi.

CARNIVAL è ammesso nei **Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale)** e nei **Disciplinari di Produzione Integrata**.

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO	Agenti del mal del piede, malattie delle foglie e della spiga (<i>Fusarium</i> spp., <i>Cercospora</i> , <i>Cladosporium</i> , <i>Puccinia</i> spp., <i>Septoria</i> , <i>Rhynchosporium</i> , <i>Helmintosporium</i> , <i>Alternaria</i>), Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	1,5 - 2 L/ha	Intervenire tra la fine dell'accostamento e l'inizio della levata per il controllo del mal del piede, da fioritura ad inizio maturazione per il controllo dei patogeni delle foglie e della spiga
	Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	1 - 1,5 L/ha	Nel caso di attacchi forti, in miscela con altri prodotti ad attività antioidica
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercospora e Oidio	2 - L/ha	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi di infezione. Impiegare un volume d'acqua pari a 400-600 L/ha. Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno
		1,2 - 1,3 L/ha	In miscela con altri prodotti
TAPPETI ERBOSI	Marciume rosa (<i>Microdochium nivale</i>)	70 mL/100 m ² in 10 - 20 litri di acqua	Intervenire preventivamente in novembre-dicembre, comunque prima delle gelate
	Dollar spot (<i>Sclerotinia homeocarpa</i>)	55 mL/100 m ² in 10 - 20 litri di acqua	Intervenire durante i periodi caldo-umidi in modo preventivo
	Elmintosporiosi (<i>Helmintosporium</i> spp.)	55 mL/100 m ² in 10 - 20 litri di acqua	Intervenire in primavera ed in autunno in modo preventivo
	Antracnosi (<i>Colletotrichum graminicola</i>)	55 mL/100 m ² in 10 - 20 litri di acqua	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



INTERVALLO DI SICUREZZA

40 giorni per frumento e orzo
20 giorni per barbabietola da zucchero

COMPOSIZIONE

Procloraz puro 35,6%
(400 g/L)

FORMULAZIONE

Liquido emulsionabile

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Nc - Non classificato

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso
per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

9634 del 14-05-1998

