



PANOCTINE® L

Fungicida liquido per la difesa dei cereali mediante la concia delle sementi

PANOCTINE® EFS

Fungicida liquido per la difesa dei cereali mediante la concia delle sementi



CARATTERISTICHE

PANOCTINE L e PANOCTINE ENERGY FOR SEEDS sono dei fungicidi attivi per contatto per la concia dei cereali, dotati di ampio spettro d'azione e particolarmente efficaci nel controllo delle Fusariosi (*Microdochium nivale* compreso), Septoria, Carie ed Elmintosporiosi. Il principio attivo Guazatina possiede un meccanismo d'azione multisito che quindi esclude il rischio di selezionare ceppi di patogeni resistenti. La formulazione liquida rende più facile la manipolazione, garantisce l'assenza di polveri inalabili ed è quindi particolarmente sicura per l'operatore. PANOCTINE L e PANOCTINE EFS sono dotati di elevata solubilità in acqua per consentire una perfetta omogeneità della poltiglia, anche lavorando con minimi volumi, e le loro eccellenti qualità garantiscono la massima scorrevolezza durante il trattamento, un'ottima adesività e persistenza sul seme.

Con PANOCTINE EFS viene introdotta un'ulteriore innovazione in termini di formulazione; infatti i coformulanti speciali impiegati, accrescono l'effetto stimolante di PANOCTINE EFS sulla germinazione e sul vigore vegetativo nelle prime fasi, oltre a rafforzarne l'efficacia. PANOCTINE L e PANOCTINE EFS sono dotati di effetto repellente sugli uccelli. Nel terreno sono pressoché innocui su lombrichi ed artropodi utili. Vengono velocemente adsorbiti dai colloidi e pertanto non vengono dilavati.

AVVERTENZE


Non sono miscibili con prodotti a spiccata reazione alcalina.
I semi trattati non devono essere destinati alla alimentazione dell'uomo e del bestiame.

PANOCTINE L


COLTURA	PATOGENO	DOSI di IMPIEGO	NOTE
CEREALI	<i>Tilletia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Septoria</i> spp., <i>Pyrenophora</i> spp.	190 mL/100 kg di seme	Per grandi quantitativi di seme la concia può essere effettuata esclusivamente servendosi degli appositi miscelatori. Per piccole quantità eseguire la concia ponendo il seme in un recipiente adatto all'operazione

CONFEZIONE

Bidone da 50 L



Shuttle da 1000 L



PANOCTINE EFS

COLTURA	PATOGENO	DOSI di IMPIEGO	NOTE
CEREALI	<i>Tilletia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Septoria</i> spp., <i>Pyrenophora</i> spp.	150-200 mL/100 kg di seme	Per grandi quantitativi di seme la concia può essere effettuata esclusivamente servendosi degli appositi miscelatori. Per piccole quantità eseguire la concia ponendo il seme in un recipiente adatto all'operazione

PANOCTINE L

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA	CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE	N° DI REGISTRAZIONE
Guazatina pura 30% (329 g/L)	Liquido solubile	Xn - Nocivo	N - Pericoloso per l'ambiente	5890 del 25-04-1984

PANOCTINE EFS

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA	CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE	N° DI REGISTRAZIONE
Guazatina pura 28% (300 g/L)	Emulsione solubile	Xn - Nocivo	N - Pericoloso per l'ambiente	13652 del 19-12-2006