



# TOMAGAN®

Nuove Colture

Erbicida di post-emergenza per cereali, mais, pomacee, agrumi, olivo



## CARATTERISTICHE

TOMAGAN è un erbicida da impiegare per trattamenti di post-emergenza contro infestanti particolarmente difficili quali Attaccamano (*Galium* spp.), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Romice (*Rumex* spp.), Lappa (*Xanthium* spp.), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*) e Vilucchione (*Calystegia sepium*). E' inoltre efficace su Canapa selvatica (*Galeopsis tetrahit*), Centocchio (*Stellaria* spp.), Rovo (*Rubus* spp.) e Sicios (*Sicyus angulatus*), Bidens (*Bidens tripartita*). Viene rapidamente assorbito dalle foglie e traslocato all'interno delle infestanti. Su cereali è particolarmente indicato in miscela con prodotti ad attività gramminicida. Su pomacee, agrumi, olivo è consigliabile l'aggiunta di TAIFUN MK per il controllo di infestanti perennanti.

**TOMAGAN è ammesso nei Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinari di Produzione Integrata di frumento tenero e duro, orzo e mais.**

## AVVERTENZE

L'impiego di TOMAGAN consente la trasemina delle leguminose 10 giorni dopo il trattamento. E' perfettamente miscibile con i gramincidi, la cui efficacia in miscela con TOMAGAN rimane inalterata.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, SEGALE, AVENA	1 L/ha	Dallo stadio di 2 foglie fino a quello di botticella
MAIS	0,4-0,7 L/ha	Non applicare oltre lo stadio di 6 foglie
POMACEE, AGRUMI, OLIVO	1,5 L/ha	Per migliorare il controllo delle specie perennanti è consigliabile l'aggiunta di TAIFUN MK



## CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



## INTERVALLO DI SICUREZZA

21 giorni per agrumi

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA	CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE	N° DI REGISTRAZIONE
Fluroxipir 20,6% (200 g/L)	Liquido emulsionabile	 Xn - Nocivo	 N - Pericoloso per l'ambiente	10710 del 15-02-2001