



SULTAN®

Erbicida selettivo per il controllo delle infestanti di aglio, carciofo, colza, cavoli e patata



CARATTERISTICHE

SULTAN è un erbicida che inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e che devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe. Viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie. SULTAN ha ampio spettro d'azione, risultando efficace su Amaranto (*Amaranthus* spp.), Borsa pastore (*Capsella bursa pastoris*), Capelline dei campi (*Apera spica-venti*), Camomille (*Anthemis*, *Matricaria* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinello (*Chenopodium* spp.), Falsa ortica (*Lamium* spp.), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Grespino (*Sonchus* spp.), Loglio (*Lolium* spp.), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Nontiscordardime (*Myosotis* spp.), Ortica minore (*Urtica urens*), Pabbio (*Setaria* spp.), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Polygonum* spp.), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Veronica (*Veronica* spp.) ed altre infestanti. L'azione di SULTAN è favorita da piogge che precedono o seguono l'intervento oppure da irrigazioni in caso di prolungata siccità.

AVVERTENZE

Distribuire SULTAN applicando 400-500 L/ha.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
AGLIO	1,5-2 L/ha	Subito dopo la messa a dimora dei bulbilli o in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie
CARCIOFO	1,5-2 L/ha	Su nuovi impianti 15-20 giorni dopo la messa a dimora dei carducci. Su impianti in produzione dopo le lavorazioni e la rincalzatura, sul terreno privo di infestanti
COLZA	2-2,5 L/ha	In pre-emergenza, subito dopo la semina ed al più tardi entro 3 giorni; in post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime 2 foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula
CAVOLI	1,5-2 L/ha	Subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto; in caso di abbondanti irrigazioni, impiegare il dosaggio più basso
PATATA	1-2 L/ha	In pre-emergenza della coltura e delle infestanti; impiegare i dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidali organici e minerali e quelli più bassi su terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



INTERVALLO DI SICUREZZA

Non necessario

COMPOSIZIONE

Metazaclor puro 44,3%
(500 g/L)

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xi - Irritante

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso
per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

11526 del 06-12-2002