



LEOPARD® 5 EC

Erbicida selettivo di post-emergenza
per il controllo delle infestanti graminacee annuali e poliennali



CARATTERISTICHE

LEOPARD 5 EC è un erbicida di post-emergenza ad azione di contatto e per assorbimento fogliare. È specificatamente indicato per il controllo delle infestanti annuali e poliennali sulle quali è attivo in un qualsiasi stadio vegetativo. Le infestanti controllate sono, tra le annuali Apera (*Apera spica-ventis*), Avena (*Avena* spp.), Coda di volpe (*Alopecurus* spp.), Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Loglio (*Lolium* spp.), Panico (*Panicum* spp.), Poa (*Poa annua*), Scagliola (*Phalaris* spp.), Setarie (*Setaria* spp.), ricacci di Cereali, mentre tra le poliennali, Gramigna comune (*Agropyron repens*), Gramigna (*Cynodon dactylon*) e Sorghetta (*Sorghum halepense*).

GOLTIX è ammesso nei Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinari di Produzione Integrata

AVVERTENZE

Le condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle infestanti migliorano e rendono più rapida l'attività di LEOPARD 5 EC. Il prodotto agisce lentamente ed occorrono mediamente 7 - 15 giorni a seconda dell'andamento climatico perché l'effetto erbicida sia visibile. In condizioni normali è miscibile con i più comuni erbici di impiego sulle colture registrate. In caso di incertezza, effettuare delle prove di saggio su piccola scala. Impiegare volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 L/ha. Non aggiungere bagnanti. Il prodotto va usato da solo.


COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
AGLIO, CIPOLLA, CARCIOFO, CAROTA, CAVOLFIORE, CAVOLO CAPPUCCIO, FAGIOLINO, FRAGOLA, LATTUGHE E SIMILI, MELONE, ZUCCHINO, PISELLO, POMODORO, RADICCHIO, SPINACIO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, SOIA, COLZA, GIRASOLE, TABACCO ED ERBA MEDICA, VIVALI DI FRUTTIFERI ED ORNAMENTALI	1-1,5 L/ha	Su infestanti fino allo stadio di 3 foglie
	1,5-2 L/ha	Su infestanti in pieno accestimento e su <i>Poa</i> spp. allo stadio di 1-2 foglie
	2 L/ha	Per il controllo di Sorghetta da rizoma ed altre poliennali in un trattamento unico eseguito alla fase di fine levata-inizio botticella. Oppure effettuare trattamenti frazionati a 1-1,5 L/ha quando le infestanti sono alte almeno 30 cm, ripetendoli successivamente sui ricacci

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



Tanico da 5 L (4x5)



INTERVALLO DI SICUREZZA

60 giorni per radicchio, cavolo cappuccio, cipolla, pomodoro, soia, girasole, colza, barbabietola da zucchero

30 giorni per carota, cavolfiore, pisello, carciofo, zucchini, fragola, melone, aglio, tabacco

20 giorni per erba medica, spinacio e fagiolino

15 giorni per lattughe e simili

COMPOSIZIONE

Quizalofop-p-etile puro 5% (50 g/L)

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Nc - Non classificato

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE

N - Pericoloso per l'ambiente



N° DI REGISTRAZIONE

11243 del 15-03-2002