



GALIGAN EC®

Erbicida selettivo per frutticole, orticole, forestali, ornamentali ed incolti



CARATTERISTICHE

GALIGAN EC è un erbicida selettivo adatto per applicazioni di pre e post-emergenza che agisce per contatto sulla vegetazione presente al momento del trattamento ma anche sulle plantule che nascono successivamente al trattamento. Sono sensibili a GALIGAN EC le graminacee *Digitaria (Digitaria sanguinalis)*, Orzo (*Hordeum vulgare*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Setaria (*Setaria* spp.), Zizzania (*Lolium temulentum*), le dicotiledoni annuali Amaranzo (*Amaranthus* spp.), Centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Papavero (*Papaver* spp.), Poligoni (*Polygonum* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*) e crucifere in genere, Datura (*Datura stramonium*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Betonica (*Stachys annua*) e le dicotiledoni perenni (nei trattamenti di post-emergenza) Acetosella (*Oxalis* spp.), Artemisia (*Artemisia* spp.), Malva (*Malva* spp.), Ortica (*Urtica dioica*), Romici (*Rumex* spp.), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Con-*

volvulus arvensis). Sulle infestanti dicotiledoni perenni, GALIGAN EC determina un effetto caustico ed un blocco della crescita. In applicazioni di pre-emergenza operare su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle, in assenza di infestanti o all'inizio della loro germinazione, distribuendo 300-800 L/ha di acqua. In applicazioni di post-emergenza bagnare uniformemente la vegetazione infestante, evitando lo sgocciolamento, distribuendo 200-500 L/ha di acqua.

AVVERTENZE

Non utilizzare su vite nel periodo compreso tra 20 giorni prima della ripresa vegetativa e l'allegagione. Su frutteti ed agrumeti sospendere i trattamenti 20 giorni prima del risveglio vegetativo. Su girasole, in impieghi di pre-emergenza, forti piogge possono determinare effetti fitotossici sulla coltura che scompaiono in breve tempo.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE E POMPELMO	2-2,5 L/ha	In pre-emergenza effettuare il trattamento a fine autunno-inizio inverno su terreno in assenza di infestanti o in presenza di infestanti in fase di germinazione. In post-emergenza delle infestanti trattare alla dose di 0,3-0,7 L/ha in miscela con TAIFUN MK (solo su impianti adulti)
VITE, PIOPPO E NOCCILOLO (dal 2° anno d'età)	2-2,5 L/ha	In pre-emergenza effettuare il trattamento a fine autunno-inizio inverno su terreno in assenza di infestanti o in presenza di infestanti in fase di germinazione. Solo su impianti adulti, in post-emergenza delle infestanti trattare alla dose di 0,3-0,7 L/ha in miscela con TAIFUN MK (escluso nocciolo)
OLIVO	2-2,5 L/ha	Trattare su impianto in produzione fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti poco sviluppate. In caso di forte infestazione alzare la dose a 3 L/ha
GIRASOLE	1 L/ha	In pre-emergenza
	1-1,5 L/ha	In pre-emergenza
CARCIOFO	1,5-2 L/ha	In post-emergenza (trattare con schermatura)
	0,2-0,6 L/ha	Trattare tra la seconda e la terza foglia della coltura con infestanti in pre-emergenza o ad inizio emergenza
CIPOLLA	0,2-0,6 L/ha	Trattare tra la seconda e la terza foglia della coltura con infestanti in pre-emergenza o ad inizio emergenza
AGLIO	0,7-1 L/ha	Trattare tra la seconda e la terza foglia della coltura con infestanti in pre-emergenza o ad inizio emergenza
COLTURE TRAPIANTATE (Cavolo, Cavolfiore)	1-2 L/ha	Intervenire 1-5 giorni prima del trapianto
VIVAI DI FORESTALI ED ORNAMENTALI	2-2,5 L/ha	Trattare in pre-emergenza delle infestanti. Su specie resinose, il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione ma prima dell'emissione dei nuovi germogli
DISERBO TOTALE DI AREE INCOLTE	4-5 L/ha	In pre-emergenza delle infestanti
	1-3 L/ha	In post-emergenza delle infestanti in miscela con TAIFUN MK (solo su impianti adulti)

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



INTERVALLO DI SICUREZZA

7 giorni per l'olivo

COMPOSIZIONE

Oxifluorfen puro 23,8% (=236 g/L)

FORMULAZIONE

Emulsione concentrata

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xn - Nocivo

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

9496 del 10-02-1998