



FEINZIN® 35 DF

Erbicida selettivo indicato per le colture di patata, pomodoro, asparago, carota, frumento e orzo, soia ed erba medica



CARATTERISTICHE

FEINZIN 35 DF è un erbicida che agisce sulle infestanti per assorbimento radicale e fogliare. Esercita un controllo elevato su un numero elevato di infestanti dicotiledoni e monocotiledoni tra cui *Abutilon theophrasti*, *Alopecurus myosuroides*, *Amaranthus* spp., *Anagallis* spp., *Atriplex patula*, *Capsella bursa pastoris*, *Centaurea* spp., *Chenopodium* spp., *Datura stramonium*, *Digitaria* spp., *Fumaria officinalis*, *Geranium* spp., *Lamium* spp., *Lolium* spp., *Matricaria* spp., *Mercurialis annua*, *Panicum* spp., *Poa annua*, *Polygonum* spp., *Portulaca oleracea*, *Raphanus* spp., *Senecio* spp., *Sinapis* spp., *Sonchus* spp., *Stellaria media*, *Thlaspis arvense*, *Veronica* spp..

FEINZIN 35 DF è ammesso nei Disciplinary Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinary di Produzione Integrata di numerose colture.

AVVERTENZE

Non eseguire il diserbo del pomodoro con FEINZIN 35 DF in serra e sotto tunnel. Distribuire il prodotto impiegando 500-700 L/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni di medio impasto-argillosi e la dose più bassa in quelli leggeri. Non impiegare nei terreni troppo leggeri.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
PATATA	0,5-0,8 kg/ha	In pre-emergenza
	0,5-0,6 kg/ha	In post-emergenza
POMODORO	0,5-0,6 kg/ha	In pre-semina, intervenendo 7-14 giorni prima della semina sul terreno già preparato e senza interrare. In pre-trapianto
	0,5-0,8 kg/ha	In post-emergenza e post-trapianto intervenendo dopo il diradamento o dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto; al momento del trattamento le piantine devono aver differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura)
SOIA	0,5-0,7 kg/ha	In pre-semina e pre-emergenza
ASPARAGO	1-1,2 kg/ha	In pre-emergenza in asparagie di almeno 2 anni
FRUMENTO, ORZO	0,2 kg/ha	In post-emergenza (dallo stadio di 2 foglie a quello di fine accestimento) in miscela con prodotti ad ampio spettro d'azione
ERBA MEDICA	1-1,5 kg/ha	Intervenire in autunno dopo l'ultimo sfalcio quando la coltura è entrata in riposo vegetativo; dose in funzione del tipo di terreno
CAROTA	0,5-0,7 kg/ha	In post-emergenza (dallo stadio di 3 foglie vere)

CONFEZIONE

Astuccio da 0,5 Kg (20x0,5)



INTERVALLO DI SICUREZZA

60 giorni per asparago, carota, erba medica, patata e soia
30 giorni per frumento ed orzo, pomodoro

FEINZIN 35 DF è un Marchio originale Feinchemie, Società del gruppo Makhteshim-Agan Industries.

COMPOSIZIONE

Metribuzin puro 35%

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Nc - Non classificato

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

8528 del 30-07-1994