



CONTATTO® TWIN

Erbicida selettivo di post-emergenza per la barbabietola da zucchero



CARATTERISTICHE

CONTATTO TWIN contiene Fenmedifam ed Etofumesate, i due principi attivi indispensabili per il diserbo di post-emergenza della barbabietola. CONTATTO TWIN è un erbicida appositamente studiato per eseguire interventi con la pratica degli interventi frazionati o delle microdosi (DMR). Tali tecniche rendono più efficaci e sicuri per la coltura i trattamenti e prevedono un impiego ripetuto di CONTATTO TWIN a dosi molto ridotte. Le infestanti sono prevalentemente controllate per contatto con l'apparato fogliare e, grazie alla presenza di Etofumesate, viene inoltre esercitata una importante azione residuale. CONTATTO TWIN controlla numerose infestanti tra cui *Avena* spp., *Alopecurus myosuroides*, *Amaranthus* spp., *Anagallis arvensis*, *Apera spica-venti*, *Atriplex* spp., *Bromus* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium album*, *Cynodon dactylon*, *Cyperus* spp., *Datura stramonium*, *Fumaria officinalis*, *Galium aparine*, *Galinsoga parviflora*, *Linaria minor*, *Malva* spp., *Matricaria* spp., *Papaver* spp., *Phalaris canariensis*, *Plantago major*, *Poa* spp., *Polygonum* spp., *Portulaca oleracea*, *Raphanus raphanistrum*, *Senecio vulgaris*, *Sinapis arvensis*, *Setaria viridis*, *Solanum nigrum*, *Sonchus oleraceus*, *Sorghum halepense*, *Spergula arvensis*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvense*, *Urtica urens*, *Veronica persica*, *Viola* spp.

CONTATTO TWIN è ammesso nei **Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale)** e nei **Disciplinari di Produzione Integrata della barbabietola da zucchero**.

AVVERTENZE

Evitare di intervenire con temperature massime elevate o su coltura in cattive condizioni vegetative (attaccate da insetti o stressate da fattori abiotici). Effettuare l'applicazione in assenza di vento, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Non intervenire nel caso di piante bagnate da rugiada e qualora si preveda una pioggia entro le 6 ore dalla applicazione.


COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
BARBABIETOLA da ZUCCHERO	1 - 1,8 L/ha (semina primaverile) 1,5 - 2 L/ha (semina autunnale)	Intervento unico con la coltura allo stadio di 2 - 4 foglie vere, impiegando 150 - 250 L/ha di acqua; adatto nel caso di buona riuscita della applicazione di pre-emergenza
	0,8 - 1,3 L/ha	Interventi frazionati con infestanti molto piccole (foglie cotiledonari) e coltura allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari ripetendo l'applicazione a 10-15 giorni; impiegare 150 - 250 L/ha di acqua
	0,5 - 0,7 L/ha	Microdosi (DMR) con infestanti molto piccole (foglie cotiledonari) e coltura allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari effettuando 3 applicazioni ad un intervallo di 7-10 giorni

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)




Tanica da 5 L (4x5)



INTERVALLO DI SICUREZZA

Non necessario

CONTATTO TWIN è un Marchio originale Feinchemie, Società del gruppo Makhteshim-Agan Industries.

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA	CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE	N° DI REGISTRAZIONE
Fenmedifam 17,86% (200 g/L) + Etofumesate 17,86% (200 g/L)	Sospensione concentrata	Nc - Non classificato	 N - Pericoloso per l'ambiente	9793 del 02-11-1998