



BRIOTRIL®

Erbicida dicotiledonicida di post-emergenza per frumento, orzo, avena e segale



CARATTERISTICHE

BRIOTRIL è un erbicida di contatto che agisce per assorbimento fogliare a cui fa seguito una limitata traslocazione, indicato per il controllo delle infestanti dicotiledoni dei cereali. Le specie su cui BRIOTRIL svolge una azione elevata sono *Capsella bursa pastoris*, *Fallopia convolvulus*, *Fumaria officinalis*, *Galeopsis tetrait*, *Galium aparine*, *Lamium* spp., *Myagrum perfoliatum*, *Matricharia* spp., *Papaver rhoeas*, *Polygonum* spp., *Raphanus raphnistrum*, *Sinapis* spp., *Stellaria media* e *Veronica* spp. Può essere impiegato da solo o a dose ridotta per completare lo spettro d'azione di altri erbicidi. È ideale su popolazioni di Papavero resistenti a solfoniluree e triazolo-pirimidine.

AVVERTENZE

Eseguire il trattamento in presenza di temperature non inferiori a 8-10 °C. Non effettuare il trattamento se si prevede una pioggia entro 6-8 ore dall'intervento. È generalmente compatibile con altri erbicidi.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
FRUMENTO TENERO e DURO, ORZO, AVENA, SEGALE	1,5-1,8 L/ha	In post-emergenza, nel periodo compreso tra la 4ª e la 5ª foglia e l'inizio della levata della coltura
	0,75-1 L/ha	In post-emergenza, nel periodo compreso tra la 4ª e la 5ª foglia e l'inizio della levata della coltura in miscela con TRIMMER WG



CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



INTERVALLO DI SICUREZZA

30 giorni su tutte le colture

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA	CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE	N° DI REGISTRAZIONE
Bromoxinil ottanoato puro 30,6% (348 g/L) + Ioxinil ottanoato puro 18,9% (215 g/L)	Concentrato emulsionabile	 Xn - Nocivo	 N - Pericoloso per l'ambiente	9377 del 29-09-1997