



# AFALON<sup>®</sup> DS

Erbicida selettivo per la lotta alle infestanti annuali di colture industriali ed orticole



## CARATTERISTICHE

AFALON DS è un erbicida in formulazione "flowable" che agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti in fase di germinazione impedendo, la germinazione del seme e lo sviluppo del germinello. E' indicato nel controllo, di infestanti annuali dicotiledoni *Amaranthus retroflexus*, *Anagallis arvensis*, *Capsella bursa pastoris*, *Chenopodium album*, *Galinsoga parviflora*, *Matricaria chamomilla*, *Mercurialis annua*, *Papaver rhoeas*, *Plantago* spp., *Polygonum* spp., *Portulaca oleracea*, *Raphanus raphanistrum*, *Senecio vulgaris*, *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Stellaria media*, *Thlaspi arvensis*, *Urtica* spp., *Veronica* spp., e *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus galli*, *Poa annua*, *Setaria* spp. tra le graminacee. Alle dosi di impiego indicate, AFALON DS non persiste nel terreno più di 2-3 mesi per cui è assolutamente sicuro per le colture in successione.

## AVVERTENZE

Non superare le dosi consigliate ed impiegare la dose più bassa nei terreni sabbiosi. Non impiegare nei terreni troppo leggeri ed in quelli poveri di sostanza organica (inferiore a 1%). Distribuire il prodotto impiegando 400-600 litri di acqua per ettaro, preferibilmente in giornate poco ventilate.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
ASPARAGO	1-2 L/ha	Su terreno preparato, prima della fuoriuscita dei turioni
CARCIOFO	0,8-1,4 L/ha	Sui nuovi impianti subito dopo la messa a dimora degli ovuli e prima dell'emergenza
	1-1,5 L/ha	Sui nuovi impianti riprodotti per carducci, 15-25 giorni dopo la messa a dimora
	1,2-1,5 L/ha	Sugli impianti vecchi alla ripresa vegetativa, prima che i germogli siano lunghi 15-20 cm
CAROTA	2 L/ha	In pre-emergenza, su seme ben coperto
	1,5 L/ha	In post-emergenza quando la coltura presenta almeno il secondo palco fogliare (4 foglie vere) e le infestanti sono allo stadio di plantula; in caso di impiego in pre-emergenza ripetuto a circa un mese dalla nascita delle piante in post-emergenza
FAGIOLO, FAGIOLINO	1-1,25 L/ha	In pre-emergenza, subito dopo la semina; nei terreni leggeri ridurre la dose a 0,8 L/ha
FINOCCHIO	0,5-1 L/ha	In post-emergenza quando la coltura ha differenziato la 4 <sup>a</sup> foglia o in post-trapianto superata la crisi
GIRASOLE	1-1,25 L/ha	In pre-emergenza della coltura, subito dopo la semina
MAIS	1,1-1,3 L/ha	In pre-emergenza della coltura, subito dopo la semina
PATATA	1,5-2 L/ha	Subito dopo la messa a dimora dei tuberi o successivamente purché prima dell'emergenza della coltura
SEDANO	1,5-2 L/ha	In post-trapianto, superata la crisi (a 8-10 giorni dal trapianto)
SOIA	0,9-1,5 L/ha	In pre-emergenza della coltura

## CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



## INTERVALLO DI SICUREZZA

60 giorni per tutte le colture

## COMPOSIZIONE

Linuron puro 37,6%  
(450 g/L)

## FORMULAZIONE

Dispersione acquosa

## CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



T - Tossico

## CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso  
per l'ambiente

## N° DI REGISTRAZIONE

6674 del 24-04-1986