



ICARUS EW®

Fungicida sistemico per la difesa di melo e pero, pesco, nettarine, ciliegio, albicocco, susino, vite, cereali e colture orticole



CARATTERISTICHE

ICARUS EW è un fungicida sistemico a base di tebuconazolo, sostanza attiva appartenente alla famiglia dei triazoli. Il prodotto è particolarmente indicato nella difesa delle drupacee dagli attacchi di Monilia nelle fasi fiorali ed in pre-raccolta, nella difesa dei cereali dai principali patogeni (includere le pericolose Fusariosi) e della vite dagli attacchi di Oidio. Su pomacee è efficace su Ticchiolatura, Maculatura bruna ed Oidio. E' inoltre indicato per il controllo dell'Oidio su cucurbitacee, Solanacee e carciofo e per la difesa dell'asparago. Possiede attività preventiva e curativa. ICARUS EW rende disponibile per la prima volta il tebuconazolo formulato in emulsione acquosa, semplificando la manipolazione del prodotto, migliorandone il profilo tossicologico ed ottimizzando l'efficacia del principio attivo contenuto. ICARUS EW è inoltre compatibile con altri agrofarmaci e non imbratta la vegetazione.

AVVERTENZE

Impiegare volumi d'acqua adeguati allo sviluppo della pianta e riportati in etichetta ICARUS EW può essere miscelato con fungicidi od insetticidi a reazione neutra. Su melo, in particolari condizioni climatiche può provocare rugginosità.


COLTURA	PATOLOGIA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
MELO	Ticchiolatura e Oidio	50-60 mL/hL	In miscela con fungicidi di copertura. Eseguire trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione
PERO	Ticchiolatura	50-60 mL/hL	Eseguire 1-2 applicazioni a cavallo della fioritura e 1-2 applicazioni in pre-raccolta ad un intervallo di 7 giorni
	Maculatura bruna	60-90 mL/hL	
PESCO, NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO, SUSINO	Monilia e Botrite	60-90 mL/hL	-
	Oidio	-	-
	Ruggine del susino	60 mL/hL	Applicare 1 o 2 volte preventivamente od alla comparsa dei primi sintomi
VITE	Oidio	50 mL/hL	Applicare ogni 10-14 giorni in miscela estemporanea con NIMROD od in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione
MELONE, ZUCCHINO, CETRIOLO, COCOMERO, POMODORO, PEPPERONE, CARCIOFO	Oidio	60 mL/hL	Intervenire con applicazioni preventive ogni 10-12 giorni al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia
ASPARAGO	Oidio, Ruggine, Stemfiliosi	60 mL/hL	Intervenire durante la stagione vegetativa, esclusivamente dopo la raccolta dei turioni, al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia
FRUMENTO, ORZO	Oidio, Septoria, Ruggini, Fusariosi, malattie del piede	1,25 L/ha	Impiegare in fase di accestimento-levata contro le malattie del piede, ad inizio levata-spigatura contro Oidio, Septoria e Ruggini ed in piena fioritura contro le Fusariosi della spiga

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



Tanica da 5 L (4x5)



INTERVALLO DI SICUREZZA

30 giorni per melo, frumento ed orzo
15 giorni per pero
14 giorni per vite
7 giorni per pesco, nettarino, ciliegio, albicocco, susino, melone, cocomero e carciofo
3 giorni per cetriolo, zuccino, pomodoro e peperone

COMPOSIZIONE

Tebuconazolo puro 19,6%
(200 g/L)

FORMULAZIONE

Emulsione acquosa

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xn - Nocivo

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso
per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

12574 del 06-02-2008