



GOLTIX 50[®] WG

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza
per la lotta alle infestanti della barbabietola da zucchero



CARATTERISTICHE

GOLTIX 50 WG è un erbicida in formulazione innovativa che agisce per assorbimento radicale e fogliare su numerose infestanti tra cui *Anagallis arvensis*, *Alopecurus myosuroides*, *Amaranthus* spp., *Capsella bursa pastoris*, *Chenopodium* spp., *Digitaria* spp., *Diploaxis* spp., *Echinochloa crus galli*, *Euphorbia* spp., *Fallopia convolvulus*, *Fumaria officinalis*, *Galinsoga parviflora*, *Lolium* spp., *Matricaria chamomilla*, *Myosotis arvensis*, *Papaver* spp., *Phalaris* spp., *Picris echioides*, *Poa annua*, *Polygonum aviculare*, *Polygonum persicaria* e *lapathifolium*, *Portulaca oleracea*, *Setaria* spp., *Solanum nigrum*, *Stachys annua*, *Stellaria media*, *Veronica* spp.. La perfetta selettività di GOLTIX 50 WG sulla barbabietola da zucchero rende possibile un uso sicuro per la coltura in pre-emergenza, in pre-emergenza tardiva ed in post-emergenza, permettendone un impiego flessibile in funzione delle infestanti presenti intervenendo a pieno campo e/o in localizzazione lungo le file. È il dicotiledonicida di base per ogni strategia di intervento, impiegabile da solo od in miscela con altri principi attivi. La nuova formulazione è stata concepita allo scopo di migliorare il profilo eco-tossicologico del prodotto e di renderne più facile il dosaggio, in particolare nella preparazione della soluzione per i trattamenti di post-emergenza.

GOLTIX 50 WG è ammesso nei Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinari di Produzione Integrata.

AVVERTENZE

In post-emergenza impiegare un volume d'acqua pari a 150-200 L/ha per le microdosi; 200-250 L/ha per gli interventi frazionati e 300 L/ha nel caso di intervento unico.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
BARBABIETOLA da ZUCCHERO	7-9 kg/ha	Pre-semina anticipata (autunno - inverno)
	5-7 kg/ha	In pre-semina, pre-emergenza, impiegare 400-600 L/ha di acqua
	4-5 kg/ha	In post-emergenza con trattamento unico allo stadio di 2-4 foglie vere, miscelando con i prodotti di contatto
	1 kg/ha	In post-emergenza negli interventi frazionati allo stadio di 2 foglie vere e ripetendo il trattamento dopo 8-10 giorni, miscelato con CONTATTO TWIN
	1 kg/ha	In post-emergenza negli interventi DMR (microdosi) prevedendo 2-3 trattamenti, miscelato con CONTATTO TWIN
SPINACIO*	2-3 kg/ha	In pre-emergenza della coltura e delle infestanti
BIETOLA DA COSTA, DA TAGLIO E BIETOLA ROSSA*	2-3 kg/ha	In pre-emergenza della coltura e delle infestanti

* in corso di estensione

CONFEZIONE

Astuccio da 1 Kg (10x1)



Sacco da 5 Kg (4x5)



INTERVALLO DI SICUREZZA

45 giorni per spinacio, bietola da costa, da taglio e bietola rossa

COMPOSIZIONE

Metamitron puro 50%

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Nc - Non classificato

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE

N - Pericoloso per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

13128 del 03-02-2006

