



TREK P®

Erbicida selettivo per la lotta alle infestanti del mais



CARATTERISTICHE

TREK P è un erbicida in formulazione liquida ad ampio spettro d'azione efficace su Amaranto (*Amaranthus* spp.), Atriplice (*Atriplex* spp.), Bidens (*Bidens tripartita*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomille (*Anthemis*, *Matricaria* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Convolvolo (*Fallopia convolvulus*), Elmintia (*Picris echioides*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Geranio (*Geranium* spp.), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Loietto (*Lolium* spp.), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poa (*Poa annua*), Poligoni (*Polygonum* spp.), Porcellana comune (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*), Stramonio (*Datura stramonium*), Veccia (*Vicia* spp.), Veronica (*Veronica* spp.) ed altre infestanti. Per la presenza di pendimetalin TREK P possiede una azione pre-condizionante le infestanti graminacee annuali ed è indicato per il diserbo di infestanti a rischio triazino-resistenza (*Amaranthus* spp., *Chenopodium* spp., *Solanum nigrum*, ecc.).

TREK P agisce prevalentemente per assorbimento radicale e la sua azione è favorita da piogge che precedono o seguono l'intervento oppure da irrigazioni in caso di prolungata siccità.

TREK P è ammesso nei Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinari di Produzione Integrata.

AVVERTENZE

Distribuire TREK P applicando 400-600 litri di acqua per ettaro. Affinché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad una equivalente irrigazione. Non ripetere il trattamento prima di sette mesi. Il prodotto non è attivo nei terreni torbosi.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
MAIS	2,8-3,1 L/ha	In pre-emergenza, in miscela con ANTIGRAM GOLD/BOLERO
	2,5 - 2,8 L/ha	In post-emergenza precoce, fino allo stadio di 2-3 foglie della coltura
SORGO*	3 L/ha	In pre-emergenza

* In corso di estensione

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



Tanica da 5 L (4x5)
Tanica da 20L (imballo singolo)



INTERVALLO DI SICUREZZA

Non necessario

COMPOSIZIONE

Terbutilazina pura 25% (270 g/L) +
Pendimetalin puro 5,9% (64 g/L)

FORMULAZIONE

Suspo-emulsione

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xi - Irritante

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso
per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

9832 del 23-11-1998