



FOX[®]

Novità

Erbicida dicotiledonico di pre e post-emergenza per frumento, orzo e tabacco

CARATTERISTICHE

FOX è un erbicida dicotiledonico caratterizzato da un posizionamento estremamente flessibile. FOX può infatti essere impiegato sia in pre-emergenza sia in post-emergenza. In particolare, in post-emergenza, se ne consiglia l'impiego dalla terza foglia fino a fine accestimento. FOX, a base di Bifenox, possiede un meccanismo d'azione diverso rispetto alle solfoniluree ed alle triazolopirimidine ed in particolare interrompe il processo di sintesi della clorofilla portando al tipico sbiancamento delle infestanti colpite. FOX agisce sia per via fogliare che per via radicale, agendo sulle giovani infestanti e sui semi in fase di germinazione. FOX è particolarmente attivo nei confronti delle seguenti infestanti: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Papavero (*Papaver* spp.), Farinaccio (*Chenopodium* spp.), Stramonio (*Datura stramonium*), Lamio (*Lamium* spp.), Poligoni (*Polygonum* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Veronica (*Veronica* spp.), Viola (*Viola* spp.). Risultano mediamente sensibili a FOX le seguenti infestanti: Ambrosia (*Ambrosia artemisiiflora*), Crisantemo campestre (*Chrysanthemum segetum*), Attaccamani (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*)

FOX è quindi un prodotto strategico per la lotta integrata alle infestanti del grano in particolare per il controllo di papavero resistente alle solfoniluree.

AVVERTENZE

Sono necessarie almeno quattro ore tra il trattamento ed un'eventuale pioggia per evitare cali di efficacia. FOX è compatibile con i più comuni erbicidi (es. solfoniluree, triazolopirimidine, gramini-cidi).



| COLTURA | DOSI di IMPIEGO | NOTE |
|--------------------------------------|-----------------|---|
| FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO, ORZO | 1-1,5 L/ha | In post-emergenza in miscela con solfoniluree (GAIO SX o TRIMMER SX) o triazolopirimidine (Es. Florasulam) fino a fine accestimento |
| | 1,5-2 L/ha | In pre-emergenza |
| TABACCO | 2 L/ha | Subito prima del trapianto |

CONFEZIONE

Flacone da 1 L (12x1)



INTERVALLO DI SICUREZZA

Non necessario per cereali
60 giorni per tabacco

COMPOSIZIONE

Bifenox puro 40,8% (480 g/L)

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Nc - Non classificato

CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO

Non classificato

N° DI REGISTRAZIONE

n° 12060 del 07-07-2004