



ACTIVUS®

Erbicida selettivo per la lotta alle infestanti annuali, graminacee e dicotiledoni di colture estensive orticole ed ornamentali

Nuove
Formulazione



CARATTERISTICHE

ACTIVUS agisce inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali. Tra le principali infestanti dicotiledoni controllate vi sono *Abutilon theophrasti*, *Ajuga* spp., *Amaranthus* spp., *Anagallis* spp., *Atriplex patula*, *Capsella bursa pastoris*, *Cardamine* spp., *Cerastium* spp., *Chenopodium* spp., *Euphorbia* spp., *Fumaria* spp., *Galium aparine*, *Heliotropium* spp., *Lamium purpureum*, *Linaria* spp., *Matricaria* spp., *Mercurialis annua*, *Myosotis* spp., *Papaver rhoeas*, *Polygonum* spp., *Portulaca oleracea*, *Ranunculus* spp., *Raphanus raphanistrum*, *Sinapis* spp., *Solanum nigrum*, *Sonchus* spp., *Spergula* spp., *Stachys annua*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvense*, *Urtica* spp., *Veronica* spp., *Viola* spp. e *Alopecurus myosuroides*, *Apera* spp., *Digitaria* spp., *Echinochloa* spp., *Lolium* spp., *Panicum* spp., *Poa* spp., *Setaria* spp., *Sorghum halepense* da seme tra le graminacee. Le erbe infestanti vengono controllate anche quando sono allo stadio di plantula, purché non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie per le graminacee e lo stadio di 2-3 foglie vere per le dicotiledoni. ACTIVUS è inoltre indicato per il diserbo di infestanti divenute triazino-resistenti (*Amaranthus* spp., *Chenopodium* spp., *Solanum nigrum*, ecc.).

ACTIVUS è ammesso nei **Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale)** e nei **Disciplinari di Produzione Integrata delle colture orticole, dei cereali e della soia.**

AVVERTENZE

Distribuire il prodotto impiegando 300-800 litri di acqua per ettaro. Impiegare le dosi più elevate solo dopo consultazione. Applicare su letto di semina ben preparato e, in caso di assenza di precipitazioni nei primi 7-10 giorni dal trattamento, eseguire una irrigazione per favorire la penetrazione del prodotto nel terreno. Non rincalzare le piantine prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento. Dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture non previste in etichetta. Invece, per le colture registrate, evitare di porre i nuovi semi a contatto con il prodotto. Non esiste alcun rischio per le successive colture da trapianto. In caso di forzate risemine sui terreni già trattati con ACTIVUS evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante riseminando alle profondità corrette senza rimuovere il terreno oppure effettuando una aratura profonda almeno 20 cm; l'aratura diviene indispensabile qualora anziché riseminare la coltura trattata si preferisca seminare barbabietola da zucchero.

COMPOSIZIONE

Pendimetalin puro 40%

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA



Xi - Irritante

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

9036 del 23-12-1996

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
AGLIO	3,3 kg/ha	In pre-emergenza e post-emergenza (da 2 foglie)
CARCIOFO	3,75 kg/ha	In pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (nelle interfile ed intorno ai ceppi)
CAROTA	3 kg/ha	In pre-emergenza
	2,25-3 kg/ha	In post-emergenza (3-4 foglie vere)
CAVOLI	2,5 kg/ha	In pre-trapianto
CIPOLLA	3,3 kg/ha	In pre-emergenza o pre-trapianto (fino ad 1 giorno prima)
	1,5-2,25 kg/ha	In post-emergenza (da 2-3 foglie)
FAVINO	3,3 kg/ha	In pre-emergenza
FINOCCHIO	3,3 kg/ha	In pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o pre-trapianto, o in post-emergenza o post-trapianto
GIRASOLE	4,3 kg/ha	In pre-emergenza
FRUMENTO, ORZO, SEGALE	3,3 kg/ha	In pre-emergenza o post-emergenza (2-3 foglie)
MAIS	4,3 kg/ha	In pre-emergenza
	3 kg/ha	In post-emergenza (2 foglie)
MELANZANA	2,5 kg/ha	In pre-trapianto
PATATA	4,3 kg/ha	In pre-emergenza o dopo la rincalzatura
PEPERONE	2,5 kg/ha	In pre-trapianto
POMODORO	2,5 kg/ha	In pre-trapianto
RISO (semina asciutta)	3,75 kg/ha	In pre-emergenza
SOIA	2,25 kg/ha	In pre-semina (incorporato) o pre-emergenza
TABACCO	4,3 kg/ha	In pre-trapianto
PIOPPO	3,75 kg/ha	In post-trapianto
ORNAMENTALI (anche in vivaio)	2,25 kg/ha	In post-trapianto
TAPPETI ERBOSI	3,3 kg/ha	In post-emergenza dopo gli sfalci di manutenzione

CONFEZIONE

Astuccio da 1 Kg (10x1)



INTERVALLO DI SICUREZZA

100 giorni per cavoli
90 giorni per frumento, orzo,
segaie, riso e mais
75 giorni per aglio, cipolla,
finocchio, melanzana,
peperone e pomodoro
60 giorni per carciofo e carota
Non necessario per le altre
colture