



OPINION[®] ECNA

Fungicida a largo spettro di azione per la difesa di numerose colture



CARATTERISTICHE

OPINION ECNA è un fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione caratterizzato da sistemica con traslocazione in senso acropeto. OPINION ECNA è efficace in modo preventivo, curativo ed eradicante con prevalenza di uno dei modi di azione a seconda dei patogeni e delle condizioni ambientali. Ha una prolungata persistenza (3-5 settimane) che lo rende in grado di proteggere le colture nel tempo e contro patogeni a differente epoca di comparsa.

OPINION ECNA è ammesso nei Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale) e nei Disciplinari di Produzione Integrata.

AVVERTENZE

Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte dei fitofarmaci e concimi fogliari di uso comune, avendo cura di versare OPINION ECNA nella botte già riempita a metà e già contenente tali prodotti mantenendo la soluzione in agitazione e completando successivamente l'operazione di riempimento.

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
VITE	Oidio	8 mL/hL	Per interventi in pre-fioritura, ad intervalli di 12-14 giorni
		12-15 mL/hL	Per interventi in post-fioritura, ad intervalli di 12-14 giorni
FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA	Oidio, Ruggini, <i>Septoria</i> spp., Rincosporiosi, <i>Helminthosporium</i> spp., <i>Cercospora</i> , <i>Fusarium</i> spp.	0,5 L/ha	In 300-500 litri di acqua
		0,6 L/ha	In presenza di forti attacchi di Oidio
BARBABIETOLA da ZUCCHERO	Cercospora e Oidio	0,8-1 L/ha	Eseguire da 2 a 4 applicazioni, intervenendo a partire dalla comparsa dei primi sintomi
CARCIOFO	Oidio	0,2 L/ha	Iniziare le applicazioni a partire dalla comparsa dei primi sintomi
PESCO	Oidio	15-20 mL/hL	A partire dallo stadio di scamicatura
	Bolla	30-40 mL/hL	Per i trattamenti "al bruno"
		20-25 mL/hL	Da bottoni rosa
	Monilia	25 mL/hL	Applicare in pre e/o post-fioritura
Marciume dei frutti da Monilia	25 mL/hL	Applicare in prossimità della raccolta	
ALBICOCCO	Monilia	25 mL/hL	Applicare in pre e/o post-fioritura
CILIEGIO e SUSINO	Marciume dei frutti da Monilia	25 mL/hL	Applicare in prossimità della raccolta
MELONE	Oidio	12-15 mL/hL	In pieno campo e dopo la rimozione del telo
RISO	Elmintosporiosi	0,4 - 0,6 L/ha	Iniziare le applicazioni a partire dalla comparsa dei primi sintomi
ROSA	Oidio	12-15 mL/hL	Interventi ripetuti possono determinare un rallentamento nella crescita della coltura
TAPPETI ERBOSI	Sclerotinia, Elmintosporiosi, Oidio, Ruggini	16-40 mL/100 m ² pari a 1,6-4 L/ha	Eseguire applicazioni cadenzate ad un intervallo di 10-21 giorni

CONFEZIONE

Flacone da 0,5 L (20x500 ml)



INTERVALLO DI SICUREZZA

42 giorni per riso
35 giorni per vite
28 giorni per frumento, orzo, segale, avena
21 giorni per barbabietola da zucchero
14 giorni per pesco, albicocco, ciliegio, susino, carciofo e melone

COMPOSIZIONE

Propiconazolo puro 25% (250 g/L)

FORMULAZIONE

Emulsione concentrata

CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA

Nc - Non classificato

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE



N - Pericoloso per l'ambiente

N° DI REGISTRAZIONE

15041 del 23-03-2011



MAKHTESHIM