

TAIFUN MK®

Erbicida sistemico di post-emergenza non selettivo



CARATTERISTICHE

TAIFUN MK è un erbicida di post-emergenza efficace su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali e perenni. TAIFUN MK è assorbito dalle foglie e traslocato in modo sistemico nelle radici e negli organi sotterranei perennanti. Si consiglia di impiegare il prodotto in prossimità della fioritura al fine di sfruttare l'attivo flusso basipeto della linfa in grado di traslocare il prodotto anche alle parti ipogee della pianta. In presenza di infestanti difficili da controllare, aggiungere a TAIFUN MK 100-150 mL/ha di Silwet FASTEX.

TAIFUN MK è ammesso nei **Disciplinari Regionali (Misure Agro Ambientali, Piani di Sviluppo Rurale)** e nei **Disciplinari di Produzione Integrata**.

AVVERTENZE

Eventuali piogge cadute entro 4-6 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia di TAIFUN MK. Per il diserbo dell'olivo la dose massima è di 6 L/ha corrispondente a 2,16 Kg/ha di sostanza attiva. TAIFUN MK è compatibile con Solfato Ammonico.

COLTURA	DOSI di IMPIEGO	NOTE
AGRUMI, MELO, PERO, NOCE, NOCCIOLIO, OLIVO, VITE DA TAVOLA E DA VINO, ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO, NETTARINA, PESCO, SUSINO, CARCIOFO, CAROTA, FAGIOLINO, FAVA, MELANZANA, PISELLO, POMODORO, PATATA, MAIS (solo interfila), SOIA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, ROSA, VIVAI E SEMENZALI DI FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPPO. In assenza di coltura per terreni destinati a FRAGOLA, ORTAGGI, BABARBIETOLA DA ZUCCHERO, FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, SOIA, RISO, PRATI E VIVAI, INCOLTI* (aree industriali e civili, bordi stradali, argini)	1-3 L/ha	Annuali e biennali (Coda di topo, Avena selvatica, Orzo selvatico, Loietto, Mercorella, Erba fienarola, Riso crudo, Sedano selvatico, Amaranto, Calendula, Farinaccio, Succiamiele, Porcellana, Ravanello selvatico, Senecio, Senape, Centocchio, Veronica)
	3,5-4,5 L/ha	Agripiro, Carice, Stoppione, Euforbio, Gliceria, Erba di San Giovanni, Serla, Scagliola, Romice, Grespino, Sorgo selvatico
	5-6 L/ha	Mestolaccio, Asfodelo, Zagole, Zigolo, Ferula, Giunco, cervino
	7-9/ha	Cappellini, Aglio, Artemisia, Canna, Gramigna, Pance, Edera, Acetosella, Gramignone, Cannuccia di palude, Felce, Ranuncolo, Rovo, ifa, Ortica
	10-11 L/ha	Aristolochia, Clematide
	4-6 L/ha	Arbusti Acero, Frassino, Ginestra, Salice, Sambuco, Mirtillo
	10-12 L/ha	Grecchia, Cisto, Erica, Caprifoglio

* In corso di registrazione

CONFEZIONE


Flacone da 1 L (12x1)



Tanica da 5 L (4x5)
Tanica da 20 L (imballo singolo)





Fusto da 1000 L



INTERVALLO DI SICUREZZA

7 giorni per olivo

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE TOSSICOLOGICA	CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE	N° DI REGISTRAZIONE
Glifosate acido puro 30,8% (360 g/l)	Liquido solubile	 Xi - Irritante	 N - Pericoloso per l'ambiente	14465 del 12-01-2009