

MERPAN 80 WDG

Composizione
CAPTANO puro g 80
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl

Via G Falcone 13- 24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

U.C.B. B-9000 ghent - BELGIO
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. -
Beer-Sheva - ISRAELE

Stabilimento di confezionamento:

BAYER ITALIA spa - Filago (BG)

**Autorizzazione Ministero della Salute n. 8102 del
09.11.1992**

KG 0,1-1-5-10-20 Partita n.....
Distribuito da : BAYER SpA - Milano



NOCIVO



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

MERPAN 80 WDG

Fungicida in granuli idrodispersibili

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobiliogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Pomacee: contro Ticchiolatura, Marciume bruno o Sclerotinia, Maculatura bruna del pero 150-160 g/hl di acqua. Contro Gloeosporium o Marciume Lenticellare effettuando sui meli il trattamento a fine agosto ripetendolo subito dopo le piogge. Non superare il numero massimo di 10 applicazioni per anno

Pesco, nettarine: contro Bolla, Corineo, Sclerotinia. Trattamenti al bruno, alla caduta delle foglie e in inverno: 300 g/hl. Trattamenti dalla ripresa vegetativa fino a fine fioritura: 150 g/hl. I trattamenti devono essere sospesi a fine fioritura.

Albicocco: contro Corineo, Sclerotinia. Trattamenti al bruno, alla caduta delle foglie e in inverno: 300 g/hl. Trattamenti alla ripresa vegetativa e in vegetazione: 150 g/hl.

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti, aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di un bagnante adesivo.

Il prodotto si impiega anche per la **CONCIA DELLE SEMENTI** di: **Mais:** contro moria ed avvizzimento dei germinelli (Pythium spp., Diplodia spp.), Marciumi delle piantine (Pythium spp., Diplodia spp., Macrophomina phaseolina, ecc.) g 60-75 per 100 Kg di seme; **Sorgo:** contro moria ed avvizzimento dei germinelli (Pythium spp., Diplodia spp.), Marciumi delle piantine (Pythium spp., Macrophomina phaseolina, ecc.) g 130-170 per 100 Kg di seme; **Cavolo e cavolfiore:** contro Marciumi g 75-90 per 100 Kg di seme; **Cocomero e melone:** contro Pythium spp. e Phytophthora spp. g 90-135 per 100 Kg di seme; **Spinacio:** contro Pythium spp. e Phytophthora spp. g 170-250 per 100 Kg di seme; **Fagiolo e pisello:** contro Pythium spp. e Phytophthora

spp. g 70-110 per 100 Kg di seme; **Altre orticole:** contro morie da Pythium spp. e Phytophthora spp. g 60-170 per 100 Kg di seme in funzione delle dimensioni del seme da trattare.

Il prodotto va stemperato in una quantità di acqua pari a 1-1,5 litri/100 Kg di semente e la miscela ottenuta può essere mescolata direttamente alla semente da trattare o spruzzata tramite apposita apparecchiatura.

Avvertenza: I semi trattati o residui dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri ecc) e prodotti a base di Olii e Zolfi. Trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Olii minerali e Zolfi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. **FITOTOSSICITA'**

Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Delicious, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).

Rischi di nocività: nocivo per gli insetti utili, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI

21GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE POMACEE, 10 GIORNI PER L'ALBICOCCO. PER PESCO E NETTARINE L'INTERVALLO DI SICUREZZA NON E' APPLICABILE IN CONSIDERAZIONE DELL'EPOCA DI IMPIEGO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E
BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE**